

Menaces

Actuellement, **les principales menaces sont les dérangements en période de nidification**, par les photographes ou lors de travaux sylvicoles lorsque la présence de la Cigogne noire n'est pas connue. Il arrive également que des individus percutent des lignes électriques ou des pales d'éoliennes.



Conserver des boisements âgés, avec de gros arbres, proches des zones d'alimentation est le meilleur moyen d'accueillir la Cigogne noire.

Protection

La Cigogne noire est **protégée en France** depuis la loi de protection de la nature de **1976**. Elle est protégée par les conventions internationales* et, dans l'Union européenne, fait partie des espèces pour lesquelles des « zones de protection spéciale » (ZPS) doivent être mises en place par les Etats membres afin de préserver leurs habitats**. En tant que nicheur, elle est classée « **en danger critique** » dans la **liste rouge régionale** et « en danger » en France.

* Convention de Washington (1973), Convention de Berne (1979) et Convention de Bonn (1979) ; ** Directive Oiseaux (1979)

Un département à reconquérir

À la suite de décennies de persécutions, la Cigogne noire s'était repliée dans ses bastions d'Europe centrale. Sa protection légale a permis sa lente expansion vers l'ouest. Afin d'accueillir l'espèce comme nicheuse régulière dans notre département, **il conviendrait de conserver un réseau de forêts très âgées**, de quelques kilomètres carrés, avec des arbres d'au moins 60 cm de diamètre.



© Gilles Perrodin

Loiret Nature Environnement

64 route d'Olivet - 45100 Orléans

02 38 56 69 84

asso@lne45.org

www.loiret-nature-environnement.org



Avec le soutien de :



www.regioncentre-valde Loire.fr



LA CIGOGNE NOIRE

Espèce emblématique des forêts du Loiret



Une cousine farouche

Contrairement à sa cousine blanche, la Cigogne noire est très discrète. C'est surtout à la fin de l'été qu'on peut l'observer, en vol ou en halte migratoire au bord des rivières et étangs forestiers. La majorité des individus passent l'hiver en Afrique sub-saharienne. **Sa nidification dans le Loiret reste exceptionnelle** et difficile à découvrir.



Longueur : 90-105 cm. **Envergure** : 173-205 cm.
Poids : 2,5-3 kg. **Longévité** : jusqu'à 18 ans.
Les adultes ont le bec et les pattes rouge vif et des reflets métalliques dans le noir du plumage ; les jeunes sont brun mat avec un bec jaune verdâtre. L'oiseau acquiert son plumage adulte dans sa troisième année.

Une spécialiste du camouflage

Le nid ressemble à celui de la Cigogne blanche mais est **soigneusement caché au cœur de la forêt**. Amas volumineux de brindilles, garni de mousse, il est installé de 10 à 20 mètres de haut, le plus souvent dans un chêne, plus rarement un pin.



La Cigogne noire construit habituellement son nid sur une branche latérale, ce qui lui permet d'y accéder sans difficulté.

Du poisson au menu

Le plus souvent, la Cigogne noire pêche dans les zones humides et les ruisseaux riches en faune aquatique au cœur des grandes forêts. Elle consomme principalement **des poissons et des grenouilles** mais insectes, crustacés et reptiles peuvent compléter le menu.



La Cigogne noire peut aller pêcher jusqu'à 15 kilomètres de son nid.

Des jeunes au nid pendant de longues semaines

Rentré d'Afrique avant la fin de l'hiver, le couple s'installe **dans un boisement âgé, avec des arbres imposants et un sous-étage fourni**. Un même nid peut être réutilisé d'une année à l'autre. Fin mars, la femelle pond de 3 à 5 œufs, qu'elle couve pendant environ 35 jours. Les poussins fraîchement éclos restent constamment sous la surveillance d'un adulte. Après une dizaine de jours, les deux parents participent activement au nourrissage.



Les éclosions ont généralement lieu début mai et les cigogneaux restent plus de deux mois sur le nid avant de prendre leur envol. À gauche, poussins âgés de quelques semaines ; à droite, jeunes proches de l'envol.



Un nicheur exceptionnel

Revenue nicher en Touraine en 1973 après des décennies d'absence en France, la Cigogne noire s'est progressivement installée dans le sud de la région Centre-Val de Loire et en Bourgogne. Dans le Loiret, les signalements augmentent régulièrement depuis les années 2010. Plus de 70 observations ont été rapportées en 2022.

À ce jour, **une seule reproduction certaine a été enregistrée dans le département**, en 2020.

Localisation des observations de Cigogne noire (1993-2022)

