

Le calendrier des sternes

C'est entre le début mai et la mi-juillet que les sternes sont les plus sensibles au dérangement car elles couvent ou élèvent leurs poussins.

Menaces

Certaines activités de loisirs représentent une **menace sérieuse** pour les sternes. C'est surtout le cas des **canoës, kayaks ou quads** mais pêcheurs ou promeneurs peuvent aussi provoquer l'envol de la colonie. L'abandon des nids laisse les œufs ou les jeunes à la merci du froid, du soleil ou des prédateurs (corneilles, goélands...).

Mais le plus catastrophique reste les crues printanières qui emportent les nichées et réduisent à néant toute tentative de reproduction.



En cas d'infraction

En cas de **perturbation intentionnelle** ou de **destruction de la colonie**, un procès-verbal entraînant des **poursuites judiciaires** peut être dressé par les agents assermentés de la Police de l'environnement avec des amendes pouvant aller de 750 à 15 000 euros*.

* Cf. Article L415-3 et R415-1 du Code de l'environnement



Loiret Nature Environnement
64 route d'Olivet - 45100 Orléans

02 38 56 69 84

www.loiret-nature-environnement.org

STERNES

Espèces emblématiques de la Loire



Protection

Les sternes sont des oiseaux **protégés par la loi**. Il est **interdit de les déranger**, de détruire leurs œufs et leurs jeunes.

Les principales îles sur lesquelles se reproduisent les sternes sont protégées par un **Arrêté préfectoral de Protection de Biotope** (APPB) qui en **interdit l'approche à moins de 50 mètres entre le 1^{er} avril et le 15 août**.



Avec le soutien de :



Des mouettes pas comme les autres...

Parmi les oiseaux blancs qui, au printemps, piaillent au-dessus de la Loire, tous ne sont pas des mouettes. Remarquez cet oiseau élancé au long bec fin et au vol élégant : c'est une sterne !

Elle se reconnaît aisément à ses longues ailes pointues, sa calotte noire et sa queue fourchue comme celle d'une hirondelle. D'ailleurs, on l'appelle aussi « hirondelle de mer » car elle vit également le long des côtes.

Deux espèces nichent sur la Loire :



La Sterne pierregarin au front noir, bec rouge et pattes rouges. 80-95 cm d'envergure, 31-35 cm de longueur, 150 g.



La Sterne naine, plus petite, au front blanc, bec jaune et pattes jaunes. 48-55 cm d'envergure, 22-24 cm de longueur, 45 g.

Ponte : 2 à 3 œufs - Incubation : 18-22 jours
Envol des jeunes : 3-4 semaines

Voyageuses intercontinentales

Les sternes sont de grandes migratrices. Elles passent l'hiver sur les côtes africaines jusqu'en Afrique du Sud et, en avril-mai, regagnent les rivages et les grands fleuves d'Europe pour se reproduire. **Certains oiseaux font ainsi près de 20 000 km par an !**

Poissons et insectes au menu !


La sterne se nourrit **principalement de petits poissons**. Elle repère ses proies en vol et plonge les harponner ! Elle complète son menu par des petits insectes qu'elle capture à la surface de l'eau.



La plage sinon rien

La Loire change de visage au gré des crues et des étiages qui remodelent les bancs de sable. C'est dans ces zones dépourvues de végétation que les sternes s'installent pour nicher.

Leur nid est une petite cuvette à même le sol où elles pondent deux à trois œufs, qui se confondent avec le sable et les graviers.



Les effectifs

